

GEL TOPIONE DE 20% BENZOCAÏNE /28 q

# Product Facts / Renseignements sur le Produit

Medicinal ingredient / Ingrédient medicinal Benzocaine / Benzocaine 20%

Purpose / Objet

Periodontal anesthetic / Anesthésie parodontale

# maxill inc.

nada MSPAC nas, UN, Callud naxill.com 1-800-268-8633 MADE/IN/USA

For the temporary relief of pain due to minor dental procedures Pour le soulagement temporaire de la douleur attribuable à des procédures

### Warnings / Précauti

 Hypersensitivity/allergy is known to occur. In such a case, discontinue use. If symptoms do not improve within seven days, irritation, pain or redness persists or worsens, or swelling, rash or fever develops, consult your dentist or other healthcare practitioner promptly. Une hypersensibilité/allergie peut se manifester. Si tel est le cas, esser l'utilisation

 Si les symptômes ne s'atténuent pas dans les sept jours, si l'irritation, la douleur ou la rougeur persiste ou s'aggrave, ou encore si de l'enflure, des éruptions cutanées ou de la fièvre survenaient, consulter sans délai votre dentiste ou un autre praticien de soins

Do not use: if allergic to benzocain Ne pas utiliser: en cas d'allergie de la henzocaine

### When using this product: Use smallest amount possible to

achieve desired result Avoid contact with eyes. If this occurs, immediately flush thoroughly with water

Lorsque vous utilisez ce produit: Utiliser la plus petite quantité possible our obtenir le résultat souhaité. Éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, rincer immédiatement et

#### abondamment les yeux avec de l'ear Stop use and ask a healthcare practitioner if the following symptoms appear: weakness, confusion, headache,

difficulty breathing and/or pale, gray or blue coloured skin. These symptoms may be signs of methemoglobinemia, a rare disorder, which may appear up to 2 hours after use Cesser d'utiliser le produit et

consulter un praticien de soins de santé si les symptômes suivants apparaissent: faiblesse, confusion, mal de tête, difficulté à respirer, pâleur ou coloration crise ou bleue de la peau. Ces symptômes pourraient être le signe d'une méthémoglobinémie, n trouble rare qui pourrait

venir jusqu'à 2 heures après l'utilisation du produit.

# Keep out of reach of children. Garder hors de portée des enfants.

Directions / Mode d'emploi For occasional use only.

# Apply to the affected area up to four

times daily with cotton, cotton applicator/swab or a fingertip up to four times daily or as directed by a dentist or other healthcare professional. • Children under 12 years of age should be supervised by an adult in the use of

this product Product is not intended for use on children less than two years of age

 Do not eat for one hour following use. Do not chew gum or food while umbness persists our un utilisation occasionnelle Appliquer sur la région affectée

iusqu'à quatre fois par jour avec du coton, un coton tige ou le bout du doigt. jusqu'à quatre fois par jour ou selon les ecommandations d'un dentiste ou d'un autre praticien de soins de santé Les enfants de moins de 12 a doivent utiliser ce produit sous la sunervision d'un adulte

■ Ne pas utiliser avec les enfants de noins de deux ans

 Ne pas manger durant une heure après utilization Ne pas mâcher de la gomme ou de la nourriture lorsque l'engourdissement nersiste

# Other information /

Autres renseignments Store in airtight container. Protect from light. Protect from freezing. Store between 15 - 30°C. ■Entreposer dans un contenant hermétique à l'abri de la lumière.

Protéger contre congéler, Conserver entre 15 à 30°C Non-Medicinal ingredients /

## Ingrédients non médicinaux Aroma, polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 3350, sodium saccharin, May contain / peut contenir

Cl 15985, Cl 16035, Cl 19140, Cl 42053, Cl 42090, Cl 45430. Questions? 1-800-268-8633 or 631-7370, www.maxill.com

REV.2018/08