Since 1901

ipana®

5% SODIUM FLUORIDE VARNISH

NPN 80034153

Item 40530

CARAMEL



Prevents Cavities
For professional dental use only

Contains: 48 units x 0.3 mL single doses

Recommended Storage: 10°C – 24°C

Medicinal Ingredient: Sodium Fluoride 5.0%

Non-Medicinal Ingredients:
beeswax, denatured alcohol, rosin, sucralose, xylitol, flavour, titanium dioxide, FD&C Red 40

Directions for Use:
Adults and children 2 years and over: Use 1 dose (0.3 mL) of ipana 5% Sodium Fluoride Varnish every 3 to 6 months depending on cavity risk formation.

See inside of box for full instructions for use and risk information.

Prévient La Carie
Pour usage professionnel des soins dentaires

Contient: 48 unités x 0.3 mL unidoses

Entreposage Recommandé: 10°C – 24°C

Ingrédient Médicinal: Fluorure de Sodium 5.0%

Ingrédients Non-Médicinaux:
cire d'abeille, alcool dénaturé, colophane, sucralose, xylitol, saveur, dioxyde de titane, CI 16035

Instructions pour Utilisation:
Adultes et enfants de plus de 2 ans: Utilisez 1 dose (0.3 mL) d'ipana 5% Vernis de Fluorure de Sodium à tous les 3 - 6 mois selon le risque de formation de carie.

Voir l'intérieur de la boîte pour les instructions complètes d'utilization et mentions de risques.

ipana® 5% SODIUM FLUORIDE VARNISH — INSTRUCTIONS FOR USE

Recommended Storage: 10°C - 24°C

ipana 5% Sodium Fluoride Varnish contains 50 mg of sodium fluoride (equivalent to 22.6 mg fluoride ion) per 1 mL. The convenient single dose package allows for easy mixing and application, for uniform results.

Directions for Use:
1. Clean the teeth and remove excess moisture from the area to be treated.
2. Grip the foil cover and slowly peel back, exposing the brush applicator and varnish well.
3. Remove the applicator brush and stir material in the well.
4. Paint a thin film of varnish onto treatment area.
5. Let the varnish dry for approximately 10 seconds and then instruct the patient to close the mouth.
6. Dispose the package and applicator after use.
7. Patient may leave immediately after treatment. Patient should be advised to remain on a soft food diet and only drink cold liquids for two hours after treatment; and do not brush for a minimum of 4 to 6 hours.
8. When dry, any excess varnish may appear "spotty" and may slide off the tooth surface. The product efficacy is not affected because there is still a full layer of varnish on the tooth.

Contraindications:
1. Ulcerative gingivitis and stomatitis
2. Known allergic reactions to fluoride
3. Avoid ingestion during application
4. Known allergies to colophony or similar materials

Interactions:
Do not apply when other fluoride treatments (gels or foams) are to be done on the same day. The use of fluoride tablets and rinses should be interrupted for several days after initial treatment.

Adverse Reactions:
Edematous swellings have been reported in rare instances, especially after application to extensive surfaces. Dyspnea, although extremely rare, has occurred in asthmatic patients.
Patients with sensitive stomachs have reported nausea on occasion. Varnish may easily be removed through tooth brushing and rinsing.

maxill inc.
St. Thomas, ON, Canada N5R 6C8
www.maxill.com 1-800-268-8633

ipana® 5% VERNIS DE FLUORURE DE SODIUM — INSTRUCTION POUR UTILISATION

Entreposage Recommandé: 10°C - 24°C

Le Vernis Fluorure de Sodium 5% d'ipana contient 50 mg de fluorure de sodium (equivalent à 22.6 mg ions fluorure) par 1 mL. Le flacon unitaire convenable vous permait un mélange et une application facile avec des resultants uniforme.

Instruction pour utilisation:
1. Nettoyez les dents et enlevez l'excéant d'humidité de la zone à être traitée.
2. Saisissez l'emballage en aluminium recouvrant l'embout et décollez lentement, vers l'extérieur, pour exposer la brosse applicatrice et bien vernir.
3. Enlevez la brosse applicatrice et bien mélangez le materiel.
4. Appliquez une mince couche de vernis sur la surface à être traitée.
5. Laissez le vernis sécher pendant environ 10 secondes pui demandez au patient de fermer la bouche.
6. Jettez l'emballage et l'applicateur après l'usage.
7. Le patient peut quitter immédiatement après le traitement. Le patient devrait être informé de suivre un régime alimentaire mou et boire seuelement des liquids froids jusqu'à deux heures après le traitement; et de ne pas se brosser les dents pour un minimum de 4 à 6 heures.
8. Lorsque le produit sèche, un excès irrégulier de vernis peut apparaître et se détacher de la surface de la dent. Ceci n'affectera en aucun temps l'efficacité du produit puisqu'il y a toujours une couche complète de vernis sur la dent.

Contre-indication:
1.Évitez d'avaler le produit lors de l'application.
2.Ne pas utiliser le produit lorsque le patient a des antécédents de réactions allergiques au fluorure.
3.Ne pas utiliser le produit lorsque le patient a des antécédents de réactions allergiques au rosin ou autres produits similaires.
4.Ne pas utiliser le produit lorsque le patient est attaint de gingivite ulcérative ou stomatite.

Interactions:
Ne pas utiliser le produit si d'autre traitements au fluorure (gel ou mousse) sont administrés dans la meme journée. L'utilisation de comprimés de fluorure et les rinçages devraient être interrompus pendant plusieurs jours à la suite du traitement initial.

Effets indésirables:
Des gonflements oedémateux ont été observés, cas rare, spécialement lorsque le produit fut utilizé sur une grande surface. La dyspnée a été observée, cas extrêmement rare, chez les patients asthmatiques. Des nausées ont été observes, à l'occasion, chez les patients ayant une sensibilité à l'estomac. Le vernis peut être facilement enlevé lors du brossage des dents ainsi qu'au rinçage.